



OFICIUL FITOSANITAR MURES
Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245
ofmures@anfd.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 25 /03.06 / 2020

In perioada imediat urmatoare, vă recomandăm să aplicați un tratament chimic pentru combaterea bolilor la legume in cimp și spații protejate (mana și septorioza tomate, mana - ceapă și usturoi, antracnoză și bacterioză la fasole și castraveti) dupa cum urmeaza:

Pentru combaterea agenților patogeni sus menționați recomandăm unul dintre produsele redate mai jos:

- un produs sistemic ca: ACROBAT MZ 69 WG - 2,0 kg/ha sau ARMETIL M (MANOXIN MIX) - 2,5 kg/ha sau ALIETTE 80 WG - 0,2% (2,0 kg/ha) sau AZBANY (TAZER) - 0,5 - 1,0 l/ha sau ORTIVA TOP - 1,0 l/ha sau PLANET 72 WP - 0,25% (2,5 kg/ha) sau RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (FUBOL GOLD) - 2,5 kg/ha;

- unul dintre produsele de contact: ALCUPRAL 50 PU - 0,25% - (2,5 kg/ha) - 0,5% (4,0-5,0 kg/ha) sau CAPTAN 80 WDG (CAIMAN) - 0,15%(1,5 kg/ha) sau DITHANE M-45 - 0,2% sau POLYRAM DF - 0,2% sau TRIUMF 40 WG - 2,0-2,5 kg/ha sau VITRA 50 WP (CUPRIDIN) - 1,5-2,0 kg/ha sau VONDOZEB (MANZATE) - 0,2%.

Daca semnalati prezenta atacului de fainare la culturile de legume utilizati unul din produsele: DAGONIS- 0,6 - 1,0 l/ha fainare sau SULPHUR 80 WG - 3 kg/ha sau DOMARK 10 EC - 0,4 l/ha (0,04%) sau MYCLOFIL - 40-60 ml/100 l apa (max. 600 ml/ha/aplicare)

Pentru fuzarioză la ardei ,castraveti, vinete, tomate, efectuati tratamente preventive, prin udarea fiecarei plante cu TOPSIN 500 SC - 0,07-0,14% (0,5- 1,0 litri suspensie/planta).

Produsele sistemice se aplică în perioada de crestere intensă a plantei, având avantaje că este absorbit rapid în plantă, oprește infecția și împiedică înmulțirea patogenului.

Produsele de contact acționează direct asupra agentului patogen cu care intră în contact, având acțiune curativă, efect mai bun cu cât este aplicat mai aproape de momentul producerii infecției în plantă.

In cazul unei infecții puternice a agentului patogen, vă recomandăm aplicarea unui produs sistemic cu unul de contact, cu efect de eradicare.

Dacă semnalati atac de : - **afide** recomandăm să utilizați unul din produsele: CLOSER- 0,2 l/ha sau TEPPEKI (HINODE) - 0,012 - 0,014%(0,12-0,14 kg/ha);

- **alti daunatori** (buhă, ploșniță, puricii la vărzoase, gărgărița la mazăre), adăugați în soluție unul din produsele: AFFIRM - 1,5 kg/ha sau CORAGEN - 125-175 ml/ha sau DECIS EXPERT 100 EC - 75 ml/ha sau MOSPILAN 20 SP (GAZELLE) - 0,0125- 0,025 %

In culturile de **mazăre** momentul optim pentru combaterea **gărgăriței** este de la formarea primelor păstăi.

Pentru tratament se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Citiți și utilizați produsele conform recomandărilor de pe ambalaj.

La combinarea produselor, acestea se solubilizează separat, apoi se amestecă.

Efectuați în prealabil testul de compatibilitate.

Recomandăm alternarea produselor cu substanțe active diferite.

NU SE VOR TRATA CULTURILE DE LEGUME PENTRU CONSUM CURENT.

Se va respecta cu strictețe timpul de pauză al fiecărui pesticid.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa:

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCHI, PROTECȚIA ANIMALELOR, ALBINELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, ÎMPOTRIVA INTOXICAȚIILOR CU PESTICIDE!

COORDONATOR,
Dr. ing. Pogăcián Maria



INTOCMIT,
Coștea Gherghina