

22. MAR 2021

ANF

Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



Tel/ Fax: 0265.435245

ofimures@anf.ro

OFICIUL FITOSANITAR MURES
Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

2163
19 03 2021 Hzo
BULETIN DE AVERTIZARE Nr.11/18. 03. 2021



Se recomandă în perioada preflorală aplicarea unui tratament chimic la măr pentru prevenirea și combaterea Gărgăriței florilor de măr (*Anthonomus pomorum*) și făinării.

Gărgărița iernează ca adult în stratul superficial al solului, în jurul coletului sau sub scoarța exfoliată a pomilor.

Primăvara, când temperatura medie a aerului ajunge la 5-6° C, apar adulții hibernanți care migrează în coroana pomilor, unde se hrănesc cu muguri. Gărgărița produce pagube atât în stadiul de adult, cât și de larvă.

Atacul cel mai păgubitor este cauzat de larve, care consumă în totalitate organele interne ale florilor (ovar, stamină), care nu se mai deschid și se usucă, bobocii floriali rămân multă vreme atârnați pe ramuri, fiind cunoscuți popular sub numele de "cuisoare". Atacă în principal atacă mărul, dar se întâlnește și în plantațiile de păr.

Tratamentului II se aplică când 10-15% din mugurii floriali sunt dez muguriți și temperatura aerului este de peste 6-8 °C - faza ce coincide cu înflorirea podbealului (*Tussilago farfara*).

Pentru tratament utilizați unul din produsele de protecție a plantelor:

POLECI (DECA 2,5 EC) - 30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %) sau

JACKPOT 2,5 EC (DELTASAP 2,5 EC) - 1,0 L/ha,

- în amestec cu un produs pentru combaterea făinării:

KARATHANE M 35 CE - 0,06 % (0,9 l/ha) sau

MICROTHIOL SPECIAL - 0,3% sau

KUMULUS DF - 0,3%.

Dacă nu ați aplicat tratamentul de iarnă care a fost recomandat cât mai aproape de umflarea mugurilor contra rapănului, focului bacterian, bolilor de scoarță și trunchi, folosiți în schema de tratament unul din produsele: **ALCUPRAL 50 PU - 0,3 % sau TRIUMF 40 WG - 0,25% sau VITRA 50 WP (CUPRIDIN) - 1,5-2,0 kg/ha**

Atentie!

Prin acest tratament sunt vizați și alți dăunători ca: minatori, purici meliferi, afide, alți defoliatori

Se efectuează în prealabil testul de compatibilitate.

Pentru tratamentul recomandat se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar, ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro>

Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.

Norma de soluție pentru par, gutui, este de 1000 litri soluție /ha iar la măr este de 1500 litri soluț

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa:


<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

<http://www.topps-drift.org/?LANG=RO>

In conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător, împotriva intoxicațiilor cu pesticide!

CONSILIER COORDONATOR

Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,
Costea Gherghina