



*S. I. C. G. M. C. S. C. V.*  
26. APR. 2022

## Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11  
Voluntari, 077190


T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
[www.anfdf.ro](http://www.anfdf.ro)



RO MURES - JUD MURES  
PRIMA PLACEREA

2 Tel/Fax: 0265.435245

OFICIUL FITOSANITAR MURES  
Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii nr. 80



### BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 12/ 20.04.2021

La măr în perioada preflorală se recomandă aplicarea unui tratament chimic pentru prevenirea și combaterea Gărgăriței florilor de măr (Anthonomus pomorum) și făinării.

Gărgărița florilor de măr iernează ca adult în stratul superficial al solului, în jurul coletului sau sub scoarța exfoliată a pomilor. Primăvara, când temperatura medie a aerului ajunge la 5–6 °C, apar adulții hibernanți care migrează în coroana pomilor, unde se hrănesc cu muguri. Gărgărița produce pagube atât în stadiul de adult cât și de larvă.

Atacul cel mai pagubitor este cauzat de larve, care consumă în totalitate organelle interne ale florilor (ovar, stamina) care nu se mai deschid și se usucă, bobocii florali rămân multă vreme în coroana pomilor, fiind cunoscuți sub numele de "cuișoare". Dăunătorul atacă în principal mărul dar se întâlnește și în plantațiile de păr.

Tratamentul II se aplică la 10 – 15% muguri florali dezmușurăți și temperatura este de 6 - 8 °C.  
Pentru tratament utilizați unul din următoarele produse pentru protecția plantelor:

POLECI (DECA 2.5 EC) – 30 – 50 ml/l apă (0,03 – 0,05%) sau

JACKPOT 2,5 EC (DELtasap 2,5 EC) – 1,0 l/ha, în amestec cu un produs pentru combaterea făinării;

KARATHANE M35 CE – 0,06% (0,9 l/ha) sau MICROTHIOL SPECIAL – 0,3% sau KUMULUS DF – 0,3%.

Dacă nu ați aplicat tratamentul de iarnă care a fost recomandat căt mai aproape de umflarea mugurilor contra rapăului, focului bacterian, bolilor de scoarță și trunchi, folosiți în schema de tratament unul din produsele: ALCUPRAL 50 PU – 0,3% SAU TRIUMF 40 WDG – 0,25% SAU VITRA 50 WP (CUPRIDIN) – 1,5 – 2,0 kg/ha.

#### ATENȚIE!

Prin acest tratament sunt vizăți și alți dăunători ca: minatori, purici meliferi, aide, alți defoliatori.

Pentru tratamentele recomandate se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar, ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa: <https://aloe.anfdf.ro/>

Norma de soluție pentru păr și gutui este de 1000 litri soluție /ha iar la măr este de 1500 litri soluție /ha.

In cazul produselor pentru protecția plantelor complexate se va efectua în prealabil testul de compatibilitate.

Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.

Tratamentele se vor efectua pe liniiștit, fără vânt.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu PPP se vor respecta prevederile legale, respective Ordinul comun nr. 45/ 1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 178/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 15b/3404/1991, al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al ACA din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii precum și a Protoocoalelor de colaborare nr. 328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016, încheiate între ANF, ACA și FAA din România.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa:  
<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

In conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnică securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător!

SEF SERVICIU  
Dr. ing. Pogacian Marian

Intocmit  
Ing. Bologa Vasile

